

## Frohon toedieningschema PTC-Pertuzumab (Trastuzumab SC)

<b>Naam:</b>	<b>Kuur:</b>	<b>Emetogeniteitsklasse: matig</b>
--------------	--------------	------------------------------------

Dag 1							Datum:	
Tijd	Pols + temp	RR	Inloop-tijd	Infuus-vloeistof	Par	Par	Medicatie	Aandachtspunten
			5 min				trastuzumab SC 600 mg/5 ml	Observatie patiënt tot 2 uur na eerste toediening van de trastuzumab
			60 min	250 ml NaCl 0,9%			pertuzumab IV 840 mg (eerste gift)	observatie patiënt tot 1 uur na toediening van de pertuzumab
			60 min	250 ml NaCl 0,9%			pertuzumab IV 420 mg (vanaf tweede gift)	.
							dexamethason 8 mg per os	30 min voor de CHT
							granisetron 2 mg per os	30 min voor de CHT
							clemastine 2 mg IV of cetirizine 10 mg per os	30 min voor de CHT
				50 ml NaCl 0,9%				spoelen
			60 min	250 ml NaCl 0,9%			paclitaxel 80 mg/m <sup>2</sup> IV	opbouwschema: eerste 15 min infuussnelheid halveren  controles: eerste 2 kuren iedere 15 min vanaf kuur 3 voor en na de kuur  0,2 micron filter gebruiken
				50 ml NaCl 0,9%				spoelen
			30 min	250 ml Glucose			Carboplatin i.v. volgens Calvert: AUC=6	
				50 ml NaCl 0,9%				spoelen

<b>Naam:</b>	<b>Kuur:</b>	<b>Emetogeniteitsklasse: laag</b>
--------------	--------------	-----------------------------------

Dag 8							Datum:	
Tijd	Pols + temp	RR	Inloop-tijd	Infuus-vloeistof	Par	Par	Medicatie	Aandachtspunten
							dexamethason 4 mg per os	30 min voor de CHT (afbouwschema*)
							clemastine 2 mg IV of cetirizine 10 mg per os	
				50 ml NaCl 0,9%				spoelen
			60 min	250 ml NaCl 0,9%			paclitaxel 80 mg/m <sup>2</sup> IV	opbouwschema: eerste 15 min infuussnelheid halveren  controles: eerste 2 kuren iedere 15 min vanaf kuur 3 voor en na de kuur  0,2 micron filter gebruiken
			15 min	50 ml NaCl 0,9%				spoelen

\*Cyclus 2 dag 8: 2 mg dexamethason

Vanaf cyclus 3 op dag 8: geen dexamethason

Bij ieder kuur op dag 1: 8 mg dexamethason (is onderdeel van anti-emetिकासchema!)