

Frohon toedieningschema Gemcitabine-Carboplatine

Naam:	Kuur:	Emetogeniteitsklasse: 3
--------------	--------------	--------------------------------

Dag 1							Datum:	
Tijd	Pols + temp	RR	Inlooptijd	Infuus-vloeistof	Par	Par	Medicatie	Aandachtspunten
							Dexamethason 8 mg p.o.	30 minuten voor de CHT
							Granisetron 2 dd 1 mg p.o. (vóór en 8 uur na de chemotherapie), of 1 mg i.v.	30 minuten voor de CHT
			15 min	50 ml NaCl 0,9%				Spoelen
			60 min	500 ml NaCl 0,9%			Gemcitabine 1000 mg/m ²	
			15 min	50 ml NaCl 0,9%				Spoelen Zelfde inloopsnelheid aanhouden als inloopsnelheid Gemcitabine
			30 min	250 ml Gluc 5%			Carboplatine AUC 5 Berekening volgens de Calvert formule.	Carboplatin is lichtgevoelig.
			15 min	50 ml NaCl 0,9%				Spoelen Zelfde inloopsnelheid aanhouden als inloopsnelheid Carboplatin.

Naam:	Kuur:	Emetogeniteitsklasse: 2
--------------	--------------	--------------------------------

Dag 8							Datum:	
Tijd	Pols + temp	RR	Inlooptijd	Infuus-vloeistof	Par	Par	Medicatie	Aandachtspunten
							Dexamethason 8 mg p.o.	30 minuten voor de CHT
			15 min	50 ml NaCl 0,9%				Spoelen
			60 min	500 ml NaCl 0,9%			Gemcitabine 1000 mg/m ²	
			15 min	50 ml NaCl 0,9%				Spoelen Zelfde inloopsnelheid aanhouden als inloopsnelheid Gemcitabine.