

Frohon toedieningschema **Vinorelbine-Trastuzumab s.c.**

Naam:	Kuur:	Emetogeniteitsklasse: minimaal
--------------	--------------	---

Dag 1							Datum:	
Tijd	Pols + temp	RR	Inlooptijd	Infuus-vloeistof	Par	Par	Medicatie	Aandachtspunten
			2-5 min				Trastuzumab = Herceptin® 600 mg/5 ml	subcutaan toedienen, 3 wekelijks (17 x) Observatie patiënt tot 2 uur na eerste toediening van de trastuzumab, daarna niet meer van toepassing.
			± 10 min	50 ml NaCl 0,9%			Vinorelbine =Navelbine® 30 mg/m ²	wekelijks
			30 min	250 ml NaCl 0,9%				extra spoelen, i.v.m. vaatirritatie Zelfde inloopsnelheid aanhouden als inloopsnelheid vinorelbine.

Naam:	Kuur:	Emetogeniteitsklasse: minimaal
--------------	--------------	---

Dag 8							Datum:	
Tijd	Pols + temp	RR	Inlooptijd	Infuus-vloeistof	Par	Par	Medicatie	Aandachtspunten
			± 10 min	50 ml NaCl 0,9%			Vinorelbine = Navelbine® 30 mg/m ²	wekelijks
			30 min	250 ml NaCl 0,9%				extra spoelen, i.v.m. vaatirritatie Zelfde inloopsnelheid aanhouden als inloopsnelheid vinorelbine.

Naam:	Kuur:	Emetogeniteitsklasse: minimaal
--------------	--------------	---

Dag 15							Datum:	
Tijd	Pols + temp	RR	Inlooptijd	Infuus-vloeistof	Par	Par	Medicatie	Aandachtspunten
			± 10 min	50 ml NaCl 0,9%			Vinorelbine = Navelbine® 30 mg/m ²	wekelijks
			30 min	250 ml NaCl 0,9%				extra spoelen, i.v.m. vaatirritatie Zelfde inloopsnelheid aanhouden als inloopsnelheid vinorelbine.

Naam:	Kuur:	Emetogeniteitsklasse: minimaal
--------------	--------------	---

Dag 22 = Dag 1							Datum:	
Tijd	Pols + temp	RR	Inlooptijd	Infuus-vloeistof	Par	Par	Medicatie	Aandachtspunten
			2-5 min				Trastuzumab = Herceptin® 600 mg/5 ml	subcutaan toedienen, 3 wekelijks (17 x)
			± 10 min	50 ml NaCl 0,9%			Vinorelbine = Navelbine® 30 mg/m ²	wekelijks
			30 min	250 ml NaCl 0,9%				extra spoelen, i.v.m. vaatirritatie Zelfde inloopsnelheid aanhouden als inloopsnelheid vinorelbine.