

Frohon toedieningschema AC dd (AC-Paclitaxel)

Naam:	Kuur:	Emetogeniteitsklasse: hoog
--------------	--------------	-----------------------------------

Dag 1							Datum:	
Tijd	Pols + temp	RR	Inlooptijd	Infuus-vloeistof	Par	Par	Medicatie	Aandachtspunten
							Aprepitant (Emend®) 125 mg p.o.	1 uur voor de CHT
							Dexamethason 12 mg p.o.	30 min voor de CHT
							Granisetron (Kytril®) 2 mg p.o.	30 min voor de CHT
				50 ml NaCl 0,9%				spoelen
			±10 min	100 ml NaCl 0,9%			Doxorubicine = Adriamycine® 60 mg/m ²	Snellopend toedienen, zonder infuuspomp, voor aansluiten controle infuus d.m.v. hevelproef.
				50 ml NaCl 0,9%				spoelen
			30 min	100 ml/ 250 ml NaCl 0,9%			Cyclofosfamide = Endoxan® 600 mg/m ²	
				50 ml NaCl 0,9%				spoelen

Aandachtspunt: 24 uur na toediening Dose Dense AC,
G-CSF = Granulocyte-colony stimulating factor (= Neulasta), s.c. toedienen