

## Frohon toedieningschema Docetaxel-Trastuzumab i.v.-Pertuzumab (vervolgkuren)

<b>Naam:</b>	<b>Kuur:</b>	<b>Emetogeniteitsklasse: laag</b>
--------------	--------------	-----------------------------------

Dag 1							Datum:	
Tijd	Pols + temp	RR	Inlooptijd	Infuus-vloeistof	Par	Par	Medicatie	Aandachtspunten
			60 min	250 ml NaCl 0,9%			Trastuzumab i.v. 6 mg/kg (vanaf tweede gift)	Observatie niet meer van toepassing, wanneer er bij eerste gift geen toedieningsreacties zijn opgetreden.
			60 min	250 ml NaCl 0,9%			Pertuzumab i.v. 420 mg (vanaf tweede gift)	Observatie patiënt tot 1 uur na toediening van de pertuzumab.
							Dexamethason 8 mg p.o.	30 min voor CHT
			60 min	250 ml NaCl 0,9% bij ≤ 200 mg, 500 ml NaCl 0,9% bij > 200 mg			Docetaxel i.v. 75 mg/m <sup>2</sup>	Bij de eerste en tweede toediening de eerste 15 min infuus op halve snelheid i.v.m. mogelijke overgevoeligheidsreactie. Iedere 15 min pols en RR controle.
			15 min	50 ml NaCl 0,9%				

Pre-medicatie: Dexamethason			
Medicatie	Dag 0 vóór de CHT	Dag 1	Dag 2
Dexamethason	8 mg p.o. 's ochtends	8 mg 30 min voor de CHT	8 mg p.o. 's ochtends
	8 mg p.o. 's avonds	8 mg p.o. 's avonds	8 mg p.o. 's avonds