

Frohon toedieningschema B-CapOx

Naam:	Kuur:	Emetogeniteitsklasse: minimaal
--------------	--------------	--

Dag 1			Kuur 7 en verder				Datum:	
Tijd	Pols + temp	RR	Inlooptijd	Infuus-vloeistof	Par	Par	Medicatie	Aandachtspunten
			15 min	100 ml NaCl 0,9%			Bevacizumab = Avastin® 7,5 mg/kg i.v.	bij eerste toediening: <ul style="list-style-type: none"> ▪ inloopsnelheid 30 minuten bij tweede e.v. toediening: <ul style="list-style-type: none"> ▪ inloopsnelheid 15 minuten Wanneer toediening zonder infuus gerelateerde reacties verloopt, kan infuussnelheid bij de 2 ^e toediening aangepast worden.
				50 ml NaCl 0,9%				spoelen

Naam:	Kuur:	Emetogeniteitsklasse: minimaal
--------------	--------------	---

Medicatie / Dag	Dag 1	Dag 2 t/m 14	Dag 15
Capecitabine = Xeloda® 1000 mg/m ² p.o. <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>niet</u> op de nuchtere maag, maar binnen 30 minuten na iets te hebben gegeten ▪ met een tussentijd van ± 12 uur 	1 x daags 's avonds	2 x daags 's ochtends en 's avonds	1 x daags 's ochtends