

Frohon toedieningschema Docetaxel (met 2dd 5 mg prednison)

Naam:	Kuur:	Emetogeniteitsklasse: laag
--------------	--------------	-----------------------------------

Dag 1							Datum:	
Tijd	Pols + temp	RR	Inlooptijd	Infuus-vloeistof	Par	Par	Medicatie	Aandachtspunten
							Dexamethason 8 mg per os	Checken of patiënt thuis dexamethason ingenomen heeft anders minimaal 30 minuten voor start kuur nog innemen
				NaCl 0,9%				Spoelen
			60 min	250 ml NaCl 0,9%			Docetaxel 75 mg/m ² intraveneus	De eerste 2 kuren het infuus gedurende 30 minuten op halve toediensnelheid, daarna ophogen naar standaard toediensnelheid.
				NaCl 0,9%				Spoelen

Thuismedicatie	Dag 0 = dag voor de kuur	Dag 1 = kuurdag	Dag 2 = dag na de kuur
Dexamethason per os 2 x daags 8 mg	's ochtends	's ochtends	's ochtends
	's avonds	's avonds	's avonds
Prednison per os 2 x daags 5 mg	Continu schema met uitzondering op dag 0,1 en 2, omdat er al dexamethason wordt gegeven		