

Frohon toedieningschema Paclitaxel

Naam:	Kuur:	Emetogeniteitsklasse: laag
--------------	--------------	-----------------------------------

Dag 1							Datum:	
Tijd	Pols + temp	RR	Inloop-tijd	Infuus-vloeistof	Par	Par	Medicatie	Aandachtspunten
							Dexamethason 4 mg per os of intraveneus	30 min. voor de kuur
							Cetirizine 10 mg oraal of Clemastine 2 mg intraveneus	30 min. voor de kuur
			30 min.	NaCl 0,9%				spoelen
			60 min.	250 ml NaCl 0,9%			Paclitaxel 80 mg/m ²	Bij eerste twee toedieningen het infuus gedurende het eerste half uur op halve toedieningssnelheid. Vervolg, als er geen infuusreactie is geweest, meteen op voorgeschreven toedieningssnelheid. De controles (P en RR) alleen bij de eerste twee toedieningen gedurende het eerste uur om de 15 min. 0,2 micron filter gebruiken.
				NaCl 0,9%				spoelen

Naam:	Kuur:	Emetogeniteitsklasse: laag
--------------	--------------	-----------------------------------

Dag 8							Datum:	
Tijd	Pols + temp	RR	Inloop-tijd	Infuus-vloeistof	Par	Par	Medicatie	Aandachtspunten
							Dexamethason 4 mg per os of intraveneus	30 min. voor de kuur
							Cetirizine 10 mg oraal of Clemastine 2 mg intraveneus	30 min. voor de kuur
			30 min.	NaCl 0,9%				spoelen
			60 min.	250 ml NaCl 0,9%			Paclitaxel 80 mg/m ²	Bij eerste twee toedieningen het infuus gedurende het eerste half uur op halve toedieningssnelheid. Vervolg, als er geen infuusreactie is geweest, meteen op voorgeschreven toedieningssnelheid. De controles (P en RR) alleen bij de eerste twee toedieningen gedurende het eerste uur om de 15 min. 0,2 micron filter gebruiken.
				NaCl 0,9%				spoelen

Naam:	Kuur:	Emetogeniteitsklasse: laag
--------------	--------------	-----------------------------------

Dag 15							Datum:	
Tijd	Pols + temp	RR	Inloop-tijd	Infuus-vloeistof	Par	Par	Medicatie	Aandachtspunten
							Dexamethason 4 mg per os of intraveneus	30 min. voor de kuur
							Cetirizine 10 mg oraal of Clemastine 2 mg intraveneus	30 min. voor de kuur
			30 min.	50 ml NaCl 0,9%				spoelen
			60 min.	250 ml NaCl 0,9%			Paclitaxel 80 mg/m ²	Bij eerste twee toedieningen het infuus gedurende het eerste half uur op halve toedieningssnelheid. Vervolg, als er geen infuusreactie is geweest, meteen op voorgeschreven toedieningssnelheid. De controles (P en RR) alleen bij de eerste twee toedieningen gedurende het eerste uur om de 15 min. 0,2 micron filter gebruiken.
				50 ml NaCl 0,9%				spoelen