

## Frohon toedieningschema Carboplatin-Paclitaxel

<b>Naam:</b>	<b>Kuur:</b>	<b>Emetogeniteitsklasse: matig</b>
--------------	--------------	------------------------------------

Dag 1							Datum:	
Tijd	Pols + temp	RR	Inloop-tijd	Infuus-vloeistof	Par	Par	Medicatie	Aandachtspunten
							Dexamethason 8 mg per os of intraveneus	30 min. voor de kuur
							Cetirizine 10 mg oraal of Clemastine 2 mg intraveneus	30 min. voor de kuur
			30 min.	NaCl 0,9%				spoelen
			60 min.	250 ml NaCl 0,9%			Paclitaxel 50 mg/m <sup>2</sup>	<p>Bij eerste twee toedieningen het infuus gedurende het eerste half uur op halve toedieningssnelheid.</p> <p>Vervolg, als er geen infuusreactie is geweest, meteen op voorgeschreven toedieningssnelheid.</p> <p>De controles (P en RR) alleen bij de eerste twee toedieningen gedurende het eerste uur om de 15 min.</p> <p>0,2 micron filter gebruiken.</p>
				50 ml NaCl 0,9%				spoelen
			30 min	250 ml – 500 ml Gluc 5%			Carboplatin AUC = 2	
				NaCl 0,9%				spoelen