

Frohon toedieningsschema Capox - trastuzumab

Naam:	Kuur:	Emetogeniteitsklasse: matig
-------	-------	-----------------------------

Dag 1 kuur 1							Datum:	
Tijd	Pols + temp	RR	Inlooptijd	Infuusvloeistof	Par	Par	Medicatie	Aandachtspunten
							Dexamethason 8 mg p.o.	30 min voor de CHT
							Granisetron 2 mg p.o.	30 min voor de CHT
			90 min	250 ml NaCl 0,9%			Trastuzumab 8 mg/m ²	oplaaddosis
				50 ml Gluc 5%				spoelen
			120 min	500 ml Gluc 5%			Oxaliplatin 130 mg/m ²	
				50 ml Gluc 5%				spoelen

Medicatie / Dag	Dag 1	Dag 2 t/m 14	Dag 15	Opmerking
Capecitabine 1000 mg/m ² per os	1 x daags 's avonds	2 x daags 's ochtends en 's avonds	1 x daags 's ochtends	<u>Niet</u> op de nuchtere maag, maar binnen 30 minuten na een maaltijd of tussendoortje, met een tussentijd van 10 - 12 uur

Naam:	Kuur:	Emetogeniteitsklasse:
--------------	--------------	------------------------------

Dag 1 kuur 2 t/m 6							Datum:	
Tijd	Pols + temp	RR	Inlooptijd	Infuusvloeistof	Par	Par	Medicatie	Aandachtspunten
							Dexamethason 8 mg p.o.	30 min voor de CHT
							Granisetron 2 mg p.o.	30 min voor de CHT
			30 min	250 ml NaCl 0,9%			Trastuzumab 6 mg/m ²	vervolgdosis
				50 ml Gluc 5%				spoelen
			120 min	500 ml Gluc 5%			Oxaliplatin 130 mg/m ²	
				50 ml Gluc 5%				spoelen

Medicatie / Dag	Dag 1	Dag 2 t/m 14	Dag 15	Opmerking
Capecitabine 1000 mg/m ² per os	1 x daags 's avonds	2 x daags 's ochtends en 's avonds	1 x daags 's ochtends	<u>Niet</u> op de nuchtere maag, maar binnen 30 minuten na een maaltijd of tussendoortje, met een tussentijd van 10 - 12 uur