

Frohon toedieningsschema nivolumab - cabozantinib

Naam:	Kuur:	Emetogeniteitsklasse: minimaal (risico < 10%)
--------------	--------------	----------------------------------------------------------------------------

Dag 1 2-wekelijks schema								Datum:
Tijd	Pols + temp	RR	Medicatie	Infuus vloeistof	Inloop tijd	Par	Par	Aandachtspunten
			Nivolumab 240 mg	100 ml NaCl 0,9%	30 min			
				NaCl 0,9%				Spoelen en waakinfuus 30 min observatie na kuur 1 en 2

Dag 1 4-wekelijks schema								Datum:
Tijd	Pols + temp	RR	Medicatie	Infuus vloeistof	Inloop tijd	Par	Par	Aandachtspunten
			Nivolumab 480 mg	100 ml NaCl 0,9%	60 min			
				NaCl 0,9%				spoelen

Thuismedicatie	Dosering	Opmerkingen
Cabozantinib tabletten	1 x daags 60 mg	De tabletten moeten heel worden ingenomen. Niet breken of vermalen. Gedurende 2 uur vóór tot 1 uur na het innemen van Cabozantinib niets eten. Een gemiste dosis kan alsnog worden ingenomen als de volgende inname over langer dan 12 uur is.