

## Frohon toedieningschema B-Capecitabine

|              |              |  |
|--------------|--------------|--|
| <b>Naam:</b> | <b>Kuur:</b> | <b>Emetogeniteitsklasse:</b><br>minimaal |
|--------------|--------------|--|

| Dag 1 |             |    |            |                     |     |     |   | Datum:  |
|-------|-------------|----|------------|---------------------|-----|-----|---|---|
| Tijd  | Pols + temp | RR | Inlooptijd | Infuus-vloeistof    | Par | Par | Medicatie                                   | Aandachtspunten   |
|       |             |    | 15 min     | 100 ml<br>NaCl 0,9% |     |     | Bevacizumab =<br>Avastin®<br>7,5 mg/kg i.v. | bij eerste toediening: <ul style="list-style-type: none"> <li>inloopsnelheid 30 minuten</li> </ul> bij tweede e.v. toediening: <ul style="list-style-type: none"> <li>inloopsnelheid 15 minuten</li> </ul> Wanneer toediening zonder infuus gerelateerde reacties verloopt, kan infuussnelheid bij de 2 <sup>e</sup> toediening aangepast worden. |
|       |             |    |            | 50 ml<br>NaCl 0,9%  |     |     |   | spoelen   |

| Medicatie / Dag   | Dag 1                      | Dag 2 t/m 14                              | Dag 15                       |
|---|----------------------------|---|------------------------------|
| Capecitabine = Xeloda®<br>1250 mg/m <sup>2</sup> p.o <ul style="list-style-type: none"> <li><u>niet</u> op de nuchtere maag, maar binnen 30 minuten na iets te hebben gegeten</li> <li>met een tussentijd van 12 uur</li> </ul> | 1 x daags<br><br>'s avonds | 2 x daags<br><br>'s ochtends en 's avonds | 1 x daags<br><br>'s ochtends |