

Frohon toedieningschema B-FOLFOX

Naam:	Kuur:	Emetogeniteitsklasse: matig
--------------	--------------	------------------------------------

Dag 1							Datum:	
Tijd	Pols + temp	RR	Inlooptijd	Infuus-vloeistof	Par	Par	Medicatie	Aandachtspunten
			30 min	100 ml NaCl 0,9%			Bevacizumab = Avastin® 7,5 mg/kg i.v.	bij eerste toediening: <ul style="list-style-type: none"> ▪ inloopsnelheid 30 minuten bij tweede e.v. toediening: <ul style="list-style-type: none"> ▪ inloopsnelheid 15 minuten Wanneer toediening zonder infuus gerelateerde reacties verloopt, kan infuussnelheid bij de 2 ^e toediening aangepast worden.
							Dexamethason 8 mg p.o.	30 min voor de CHT
							Granisetron 2 mg p.o.	30 min voor de CHT
				50 ml Gluc 5%				spoelen
			120 min	500 ml Gluc 5%			Oxaliplatin 85 mg/m ²	Oxaliplatin mag in het systeem niet samen lopen met 5-FU!
				50 ml Gluc 5%				spoelen
				50 ml NaCl 0,9%				spoelen
			120 min	100 ml NaCl 0,9%			Folinezuur 400 mg/m ²	
				50 ml NaCl 0,9%				spoelen
			10-15 min	100 ml NaCl 0,9%			5-Fluorouracil 400 mg/m ²	
			44 uur				5-Fluorouracil 2400 mg/m ²	via folfusor pomp