

## Frohon toedieningschema Panitumumab

<b>Naam:</b>	<b>Kuur:</b>	<b>Emetogeniteitsklasse:</b> minimaal
--------------	--------------	--

Dag 1							Datum:	
Tijd	Pols + temp	RR	Inlooptijd	Infuus-vloeistof	Par	Par	Medicatie	Aandachtspunten
			60 min	100 ml NaCl 0,9%			Panitumumab = Vectibix® 6 mg/kg bij doseringen ≤ 1000 mg	toediening met 0,22 µm filter, is nl. laag eiwitbindend
			90 min	150 ml NaCl 0,9%			of Panitumumab = Vectibix® 6 mg/kg bij doseringen > 1000 mg	
				50 ml NaCl 0,9%				spoelen

<b>Naam:</b>	<b>Kuur:</b>	<b>Emetogeniteitsklasse: minimaal</b>
--------------	--------------	---

Vervolg							Datum:	
Tijd	Pols + temp	RR	Inlooptijd	Infuus- vloeistof	Par	Par	Medicatie	Aandachtspunten
			30 min	100 ml NaCl 0,9%			Panitumumab = Vectibix® 6 mg/kg bij doseringen ≤ 1000 mg	Wanneer toediening zonder infuusgerelateerde reacties verlopen is op dag 1, kan infuussnelheid bij de 2 <sup>e</sup> e.v. naar 30 minuten.
			60 min	100 ml NaCl 0,9%			of  Panitumumab = Vectibix® 6 mg/kg bij doseringen > 1000 mg	Wanneer toediening zonder infuusgerelateerde reacties verlopen is op dag 1, kan infuussnelheid bij de 2 <sup>e</sup> e.v. naar 60 minuten.
				50 ml NaCl 0,9%				toedienen met 0,22 µm filter, is nl. laag eiwitbindend spoelen