

## Frohon toedieningschema **FEC**

|              |              |                                   |
|--------------|--------------|-----------------------------------|
| <b>Naam:</b> | <b>Kuur:</b> | <b>Emetogeniteitsklasse: hoog</b> |
|--------------|--------------|-----------------------------------|

| Dag 1 |             |    |            |                     |     |     | Datum:                                       |   |
|-------|-------------|----|------------|---------------------|-----|-----|--|---|
| Tijd  | Pols + temp | RR | Inlooptijd | Infuus-vloeistof    | Par | Par | Medicatie                                    | Aandachtspunten   |
|       |             |    |            |                     |     |     | Aprepitant (Emend®)<br>125 mg p.o.           | 1 uur voor de CHT   |
|       |             |    |            |                     |     |     | Dexamethason<br>12 mg p.o.                   | 30 min voor de CHT  |
|       |             |    |            |                     |     |     | Granisetron = Kytril®<br>2 mg p.o.           | 30 min voor de CHT  |
|       |             |    | 20 min     | 100 ml<br>NaCl 0,9% |     |     | Epirubicine i.v.<br>100 mg/m <sup>2</sup>    | Snellopend toedienen,<br>zonder infuuspomp, voor<br>aansluiten controle infuus<br>d.m.v. hevelproef |
|       |             |    |            | 50 ml<br>NaCl 0,9%  |     |     |  | spoelen   |
|       |             |    | 15 min     | 100 ml<br>NaCl 0,9% |     |     | 5-Fluorouracil i.v.<br>500 mg/m <sup>2</sup> |   |
|       |             |    |            | 50 ml<br>NaCl 0,9%  |     |     |  | spoelen   |
|       |             |    | 30 min     | 500 ml<br>NaCl 0,9% |     |     | Cyclofosfamide i.v.<br>500 mg/m <sup>2</sup> |   |
|       |             |    |            | 50 ml<br>NaCl 0,9%  |     |     |  | spoelen   |