

Frohon toedieningschema Paclitaxel-Trastuzumab s.c.

| | | |
|--------------|--------------|-----------------------------------|
| Naam: | Kuur: | Emetogeniteitsklasse: laag |
|--------------|--------------|-----------------------------------|

| Dag 1 | | | | | | | Datum: | |
|-------|-------------|----|------------|------------------|-----|-----|---|---|
| Tijd | Pols + temp | RR | Inlooptijd | Infuus-vloeistof | Par | Par | Medicatie | Aandachtspunten |
| | | | 2-5 min. | | | | Trastuzumab 600 mg /5 ml | Subcutaan toedienen 3 wekelijks (17x) |
| | | | | 100 ml NaCl 0,9% | | | | Waakinfuus Observatie patiënt tot 2 uur na eerste toediening van de Trastuzumab, daarna niet meer van toepassing. |
| | | | | | | | Dexamethason 4 mg per os of intraveneus | 30 min. voor de kuur |
| | | | | | | | Cetirizine 10 mg oraal of Clemastine 2 mg intraveneus | 30 min. voor de kuur |
| | | | 30 min. | NaCl 0,9% | | | | spoelen |
| | | | 60 min. | 250 ml NaCl 0,9% | | | Paclitaxel 80 mg/m ² | Bij eerste twee toedieningen het infuus gedurende het eerste half uur op halve toedieningssnelheid. Vervolg, als er geen infuusreactie is geweest, meteen op voorgeschreven toedieningssnelheid. De controles (P en RR) alleen bij de eerste twee toedieningen gedurende het eerste uur om de 15 min. 0,2 micron filter gebruiken. |
| | | | | NaCl 0,9% | | | | spoelen |

| | | |
|--------------|--------------|-----------------------------------|
| Naam: | Kuur: | Emetogeniteitsklasse: laag |
|--------------|--------------|-----------------------------------|

| Dag 8 | | | | | | | Datum: | |
|-------|-------------|----|------------|---------------------|-----|-----|---|--|
| Tijd | Pols + temp | RR | Inlooptijd | Infuus-vloeistof | Par | Par | Medicatie | Aandachtspunten |
| | | | | | | | Dexamethason 4 mg per os of intraveneus | 30 min. voor de kuur |
| | | | | | | | Cetirizine 10 mg oraal of Clemastine 2 mg intraveneus | 30 min. voor de kuur |
| | | | 30 min. | NaCl 0,9% | | | | spoelen |
| | | | 60 min. | 250 ml NaCl 0,9% | | | Paclitaxel 80 mg/m ² | <p>Bij eerste twee toedieningen het infuus gedurende het eerste half uur op halve toedieningssnelheid.</p> <p>Vervolg, als er geen infuusreactie is geweest, meteen op voorgeschreven toedieningssnelheid.</p> <p>De controles (P en RR) alleen bij de eerste twee toedieningen gedurende het eerste uur om de 15 min.</p> <p>0,2 micron filter gebruiken.</p> |
| | | | | NaCl 0,9% | | | | spoelen |

| | | |
|--------------|--------------|-----------------------------------|
| Naam: | Kuur: | Emetogeniteitsklasse: laag |
|--------------|--------------|-----------------------------------|

| Dag 15 | | | | | | | Datum: | |
|--------|-------------|----|------------|---------------------|-----|-----|--|--|
| Tijd | Pols + temp | RR | Inlooptijd | Infuus-vloeistof | Par | Par | Medicatie | Aandachtspunten |
| | | | | | | | Dexamethason 4 mg per os of intraveneus | 30 min. voor de kuur |
| | | | | | | | Cetirizine 10 mg oraal of Clemastine 2 mg intraveneus | 30 min. voor de kuur |
| | | | 30 min. | NaCl 0,9% | | | | spoelen |
| | | | 60 min. | 250 ml NaCl 0,9% | | | Paclitaxel 80 mg/m ² | <p>Bij eerste twee toedieningen het infuus gedurende het eerste half uur op halve toedieningssnelheid.</p> <p>Vervolg, als er geen infuusreactie is geweest, meteen op voorgeschreven toedieningssnelheid.</p> <p>De controles (P en RR) alleen bij de eerste twee toedieningen gedurende het eerste uur om de 15 min.</p> <p>0,2 micron filter gebruiken.</p> |
| | | | | NaCl 0,9% | | | | spoelen |