

Frohon toedieningschema Paclitaxel-Trastuzumab i.v. (kuur 1)

| | | |
|--------------|--------------|-----------------------------------|
| Naam: | Kuur: | Emetogeniteitsklasse: laag |
|--------------|--------------|-----------------------------------|

| Dag 1 | | | | | | | Datum: | |
|-------|-------------|----|------------|------------------|-----|-----|---|---|
| Tijd | Pols + temp | RR | Inlooptijd | Infuus-vloeistof | Par | Par | Medicatie | Aandachtspunten |
| | | | | 100 ml NaCl 0,9% | | | | spoelinfuus Observatie patiënt tot 2 uur na eerste toediening van de Trastuzumab. |
| | | | | | | | Dexamethason 4 mg per os of IV | minimaal 30 minuten voor de paclitaxel |
| | | | | | | | Cetirizine 10 mg per os of clemastine 2 mg IV | minimaal 30 minuten voor de paclitaxel |
| | | | 90 min | 250 ml NaCl 0,9% | | | Trastuzumab IV 8 mg/kg | Oplaaddosis |
| | | | | NaCl 0,9% | | | | spoelen |
| | | | 60 min. | 250 ml NaCl 0,9% | | | Paclitaxel 80 mg/m ² IV | Bij eerste twee toedieningen het infuus gedurende het eerste half uur op halve toedieningssnelheid. Vervolg, als er geen infuusreactie is geweest, meteen op voorgeschreven toedieningssnelheid. De controles (P en RR) alleen bij de eerste twee toedieningen gedurende het eerste uur om de 15 min. |
| | | | | NaCl 0,9% | | | | 0,2 micron filter gebruiken. spoelen |

| | | |
|--------------|--------------|-----------------------------------|
| Naam: | Kuur: | Emetogeniteitsklasse: laag |
|--------------|--------------|-----------------------------------|

| Dag 8 | | | | | | | Datum: | |
|-------|-------------|----|------------|---------------------|-----|-----|---|--|
| Tijd | Pols + temp | RR | Inlooptijd | Infuus-vloeistof | Par | Par | Medicatie | Aandachtspunten |
| | | | | | | | Dexamethason 2 mg per os of IV | 30 minuten voor de kuur |
| | | | | | | | Cetirizine 10 mg per os of clemastine 2 mg IV | 30 minuten voor de kuur |
| | | | | NaCl 0,9% | | | | spoelinfuus |
| | | | 60 min. | 250 ml NaCl 0,9% | | | Paclitaxel 80 mg/m ² IV | <p>Bij eerste twee toedieningen het infuus gedurende het eerste half uur op halve toedieningssnelheid.</p> <p>Vervolg, als er geen infuusreactie is geweest, meteen op voorgeschreven toedieningssnelheid.</p> <p>De controles (P en RR) alleen bij de eerste twee toedieningen gedurende het eerste uur om de 15 min.</p> <p>0,2 micron filter gebruiken.</p> |
| | | | | NaCl 0,9% | | | | spoelinfuus |

| | | |
|--------------|--------------|-----------------------------------|
| Naam: | Kuur: | Emetogeniteitsklasse: laag |
|--------------|--------------|-----------------------------------|

| Dag 15 | | | | | | | Datum: | |
|--------|-------------|----|------------|------------------|-----|-----|---|------------------------------|
| Tijd | Pols + temp | RR | Inlooptijd | Infuus-vloeistof | Par | Par | Medicatie | Aandachtspunten |
| | | | | | | | Cetirizine 10 mg per os of clemastine 2 mg IV | 30 minuten voor de kuur |
| | | | 30 min. | NaCl 0,9% | | | | spoelinfuus |
| | | | 60 min. | 250 ml NaCl 0,9% | | | Paclitaxel 80 mg/m ² | 0,2 micron filter gebruiken. |
| | | | | NaCl 0,9% | | | | spoelen |