

Frohon toedieningschema Paclitaxel-Trastuzumab IV (kuur 2 en verder)

Naam:	Kuur:	Emetogeniteitsklasse: laag
--------------	--------------	-----------------------------------

Dag 1							Datum:	
Tijd	Pols + temp	RR	Inlooptijd	Infuus-vloeistof	Par	Par	Medicatie	Aandachtspunten
				NaCl 0,9%				spoelinfuus
			30 min	250 ml NaCl 0,9%			trastuzumab IV 6 mg/kg	
							dexamethason 4 mg per os of IV	30 minuten voor de kuur
							cetirizine 10 mg per os of clemastine 2 mg IV	30 minuten voor de kuur
			30 min.	NaCl 0,9%				spoelen
			60 min.	250 ml NaCl 0,9%			paclitaxel 80 mg/m ² IV	0,2 micron filter gebruiken.
				NaCl 0,9%				spoelen

Naam:	Kuur:	Emetogeniteitsklasse: laag
--------------	--------------	-----------------------------------

Dag 8							Datum:	
Tijd	Pols + temp	RR	Inlooptijd	Infuus-vloeistof	Par	Par	Medicatie	Aandachtspunten
				NaCl 0,9%				spoelinfuus
							dexamethason 2 mg per os of IV	30 minuten voor de kuur
							cetirizine 10 mg per os of clemastine 2 mg IV	30 minuten voor de kuur
			30 min.	NaCl 0,9%				spoelen
			60 min.	250 ml NaCl 0,9%			paclitaxel 80 mg/m ² IV	0,2 micron filter gebruiken.
				NaCl 0,9%				spoelen

Naam:	Kuur:	Emetogeniteitsklasse: laag
--------------	--------------	-----------------------------------

Dag 15							Datum:	
Tijd	Pols + temp	RR	Inlooptijd	Infuus-vloeistof	Par	Par	Medicatie	Aandachtspunten
				NaCl 0,9%				spoelinfuus
							cetirizine 10 mg per os of clemastine 2 mg IV	30 minuten voor de kuur
			30 min.	NaCl 0,9%				spoelen
			60 min.	250 ml NaCl 0,9%			paclitaxel 80 mg/m ² IV	0,2 micron filter gebruiken.
				NaCl 0,9%				spoelen