

## Frohon toedieningschema Dacarbazine

<b>Naam:</b>	<b>Kuur:</b>	<b>Emetogeniteitsklasse: 4</b>
--------------	--------------	--------------------------------

Dag 1							Datum:	
Tijd	Pols + temp	RR	Inlooptijd	Infuus-vloeistof	Par	Par	Medicatie	Aandachtspunten
							Aprepitant (Emend®) 125 mg p.o.	1 uur voor de CHT
							Dexamethason 12 mg p.o.	30 minuten voor de CHT
							Granisetron 1 mg p.o.	2 dd 1 mg p.o. (vóór en 8 uur na de chemotherapie), of 1 mg i.v.
				50 ml NaCl 0,9%				Spoelen
			30 of 60 min	250 ml NaCl 0,9%			Dacarbazine 800 mg/m <sup>2</sup>	Dacarbazine is erg licht gevoelig. Gebruik <u>geen</u> licht doorlatende infuussystemen. Bescherm infuusarm, tegen licht, met een deken.  Afhankelijk van de plaats, dikte en conditie van de vene, infusiesnelheid aanpassen.
				50 ml NaCl 0,9%				Spoelen  Tijdens spoelen dezelfde inloopsnelheid aanhouden als inloopsnelheid Dacarbazine.